

Bí đỏ dễ trồng, không kén đất

Bí đỏ thích nghi rộng với điều kiện vùng nhiệt đới, có thể trồng ở đồng bằng cho đến cao nguyên 1.500m.

Nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển từ 18 - 27 độ C. Cây sinh trưởng tốt trong điều kiện cường độ chiếu sáng mạnh, có khả năng chịu hạn khá nhưng nếu khô hạn quá dễ bị rụng hoa và quả non.

Có nhiều giống bí đỏ, trong đó có 2 loại được ưa chuộng nhất là bí Vàm Răng và bí quả dài. Giống bí Vàm Răng có quả tròn đẹp, có khía, nặng 3 - 5kg, quả già màu vàng, vỏ hai da, thịt dày, dẻo, màu vàng tươi, phẩm chất ngon. Còn bí quả dài có hình bầu dục dài, nặng 1 - 2kg, vỏ vàng xanh hay vàng, thịt mỏng, màu vàng tươi đến vàng cam, ít dẻo, ngon ngọt.

Loại phân	Lượng phân	Bón lót	Thúc lần 1 (20 ngày sau trồng)	Thúc lần 2 (40 ngày sau trồng)	Thúc nuôi trái
Phân chuồng (m ²)	30	30			
Vôi (kg)	1.000	1.000			
Phân 16-16-8	600	200		200	200
Urê (kg)	250				250
DAP (kg)	150		120	30	
KCl (kg)	100				100

Bí đỏ trồng được quanh năm, tùy theo điều kiện đất và nước từng nơi mà bố trí trong mùa khô hay mùa mưa. Mùa khô gieo tháng 11 - 1 dương lịch, thu hoạch tháng 3 - 4; mùa mưa gieo tháng 5 - 6, thu hoạch tháng 8 - 9 dương lịch.

Bí đỏ dễ trồng không kén đất, có thể trồng trên đất bờ hoặc đất ruộng sau mùa lúa, nhưng tốt nhất là đất mới khai phá. Đất được cuốc lên lớp đôi, khoảng cách giữa 2 tim mương 5 - 6m, mương rộng 0,4 - 0,6m, mặt luống rộng 0,7m, cao 0,2 - 0,3m, khoảng cách cây trên luống 0,5 - 0,7m, mật độ 5.500 - 7.500 cây/ha. Hạt gieo

thẳng hoặc gieo trong bầu, thường ngâm ủ cho nảy mầm trước khi gieo. Lượng giống gieo 1 - 1,5kg/ha tùy giống. Cây con đem trồng có 1 - 2 lá nhám.

Lượng phân bón cho 1ha bí đỏ gồm N: từ 230 - 250kg, P₂O₅: 150 - 200kg, K₂O: 90 - 100kg. Ngoài lượng phân trên có thể phun phân qua lá định kỳ 7 - 10 ngày/lần như Bayfolan, HVP, Komix, Bioted... để giúp cây khoẻ mạnh, tăng trưởng nhanh, cho quả tốt. Phải cung cấp đầy đủ nước cho bí trong mùa khô, nhất là giai đoạn ra hoa và thoát nước tốt trong mùa mưa không để rễ cây bị úng. Khi dây bí dài 1m, lấy đất đắp đoạn thân giúp cây phát triển rễ phụ tăng khả năng hút chất dinh dưỡng, cây sinh trưởng tốt hơn. Bí có khả năng đâm nhánh mạnh nên ra rất nhiều nhánh. Mỗi cây chỉ nên chừa 2 - 4 nhánh tốt nhất hoặc dây chính và 1,2 dây nhánh, tỉa hết các nhánh khác làm rau ăn để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Cũng tỉa bớt các lá chân hoặc lá vàng úa, giúp thông thoáng ong bướm dễ tìm hoa hút nhụy, tăng tỷ lệ đậu quả.

□*Nguồn: Nông thôn ngày nay*